









Total de asistentes: 39.
Anfitriones de la sesión de Zoom: 4.
Todas las respuestas anónimas / 5 preguntas.

Antes de la presentación			Después de la presentación		
Respuestas	Tiempo típico empleado	Tasa de finalización ⓘ	Respuestas	Tiempo típico empleado	Tasa de finalización ⓘ
19	1.6 minutos	100%	20	1.2 minutos	100%
1. Tumor intracraneano extra-axial más frecuente en adultos: (Opción única) *					
 ■ Gliosarcoma ■ Meningioma ■ Sarcoma histiocítico ■ Schwannoma			 ■ Gliosarcoma ■ Meningioma ■ Sarcoma histiocítico ■ Schwannoma		
Respuesta correcta: Meningioma					
2. Diagnóstico diferencial imagenológico e histopatológico de meningioma: (Opción única) *					
 ■ Sarcoma primario intracraneano, DICER1-mutante ■ Tumor fibroso solitario ■ Metástasis ■ Cordoma ■ Todas las anteriores			 ■ Sarcoma primario intracraneano, DICER1-mutante ■ Tumor fibroso solitario ■ Metástasis ■ Cordoma ■ Todas las anteriores		
Respuesta correcta: Todas las anteriores					

Antes de la presentación	Después de la presentación																				
3. De acuerdo con la clasificación OMS/SNC 2021, selecciona la aseveración correcta: (Opción única) *																					
<table> <tr> <th>Opciones</th><th>Respuestas</th></tr> <tr> <td>El término meningioma anaplásico ya no es utilizado.</td><td>5/19 (26%)</td></tr> <tr> <td>El marcador receptor 2a de somatostatina (SSTR2A) se expresa únicamente en meningiomas.</td><td>1/19 (5%)</td></tr> <tr> <td>El tumor fibroso solitario pertenece al grupo de los tumores de diferenciación indeterminada.</td><td>2/19 (11%)</td></tr> <tr> <td>El término hemangiopericitoma ya no es utilizado.</td><td>11/19 (58%)</td></tr> </table>	Opciones	Respuestas	El término meningioma anaplásico ya no es utilizado.	5/19 (26%)	El marcador receptor 2a de somatostatina (SSTR2A) se expresa únicamente en meningiomas.	1/19 (5%)	El tumor fibroso solitario pertenece al grupo de los tumores de diferenciación indeterminada.	2/19 (11%)	El término hemangiopericitoma ya no es utilizado.	11/19 (58%)	<table> <tr> <th>Opciones</th><th>Respuestas</th></tr> <tr> <td>El término meningioma anaplásico ya no es utilizado.</td><td>2/20 (10%)</td></tr> <tr> <td>El marcador receptor 2a de somatostatina (SSTR2A) se expresa únicamente en meningiomas.</td><td>1/20 (5%)</td></tr> <tr> <td>El tumor fibroso solitario pertenece al grupo de los tumores de diferenciación indeterminada.</td><td>0/20 (0%)</td></tr> <tr> <td>El término hemangiopericitoma ya no es utilizado.</td><td>17/20 (85%)</td></tr> </table>	Opciones	Respuestas	El término meningioma anaplásico ya no es utilizado.	2/20 (10%)	El marcador receptor 2a de somatostatina (SSTR2A) se expresa únicamente en meningiomas.	1/20 (5%)	El tumor fibroso solitario pertenece al grupo de los tumores de diferenciación indeterminada.	0/20 (0%)	El término hemangiopericitoma ya no es utilizado.	17/20 (85%)
Opciones	Respuestas																				
El término meningioma anaplásico ya no es utilizado.	5/19 (26%)																				
El marcador receptor 2a de somatostatina (SSTR2A) se expresa únicamente en meningiomas.	1/19 (5%)																				
El tumor fibroso solitario pertenece al grupo de los tumores de diferenciación indeterminada.	2/19 (11%)																				
El término hemangiopericitoma ya no es utilizado.	11/19 (58%)																				
Opciones	Respuestas																				
El término meningioma anaplásico ya no es utilizado.	2/20 (10%)																				
El marcador receptor 2a de somatostatina (SSTR2A) se expresa únicamente en meningiomas.	1/20 (5%)																				
El tumor fibroso solitario pertenece al grupo de los tumores de diferenciación indeterminada.	0/20 (0%)																				
El término hemangiopericitoma ya no es utilizado.	17/20 (85%)																				
<i>Respuesta correcta:</i> El término hemangiopericitoma ya no es utilizado.																					
4. Marcador de inmunohistoquímica más sensible y específico para el diagnóstico de tumor fibroso solitario: (Opción única) *																					
																					
<i>Respuesta correcta:</i> STAT6																					

Antes de la presentación	Después de la presentación
5. ¿Los cuestionarios diagnósticos te parecen útiles? (Escala de valoración) * (20/20) 100% respondido 4: Me parecen muy útiles 0: No me parecen útiles en absoluto	5. El contenido y la dinámica de la sesión me parecen adecuados. (Escala de valoración) * (19/19) 100% respondido 4: Me parecen muy adecuados 0: No me parecen adecuados en absoluto
 ■ Me parecen muy útiles ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■ No me parecen útiles en absoluto	 ■ Me parecen muy adecuados ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■ No me parecen adecuados en absoluto

¡ Gracias por tu participación !